

5. Geen nagellak a.u.b.

6. In verband met privacy van patiënten en personeel a.u.b. niet filmen en fotograferen in de praktijk.



Instructie Narcose

INSTRUCTIES VOORBEREIDING VOOR NARCOSE VOOR TANDHEELKUNDIGE BEHANDELING

1. Niets eten of melk drinken op de dag van de behandeling

Uw kind moet nuchter blijven voorafgaand aan de behandeling. Als uw kind gegeten of gedronken heeft, gaat de behandeling niet door. Dat is geen onwil van onze kant, maar een noodzakelijke veiligheidsmaatregel voor uw kind. De maaginhoud kan tijdens de behandeling omhoog komen en in de longen terecht komen, dit is een levensbedreigende complicatie.

1a: Uitzondering: Heldere vloeistoffen zoals water, thee en ranja mag **tot 2 uur** voor de behandeling.

1b: Uitzondering: Indien de afspraak van uw kind s middags gepland staat, mag uw kind **tot 6 uur** voor de behandeling een licht ontbijtje (zoals een boterham, beschuit of cracker met jam).

2. Geef paracetamol 1 uur voor de afspraak ter voorkoming van napijn

Tandheelkundige behandelingen kunnen pijnlijk zijn. Natuurlijk verdoven wij alle pijnlijke behandeling, maar die verdoving is na een paar uur uitgewerkt. Het is belangrijk dat het kind dan een langwerkende pijnstiller krijgt. Het is een goed idee daar vóór de behandeling mee te beginnen. Dan werkt de paracetamol beter.

Geef uw kind de paracetamol zetpil(len) 1 uur vóór de afspraak die u van de anesthesioloog heeft meegekregen. Dat is

OPLAAD dosering:

- Gewicht tot 12-25 kg: 500mg;
- Gewicht boven de 25 kg: 1000 mg.

Na de tandheelkundige behandeling kan doorgegaan worden met **NORMALE** dosering paracetamol


3. Warme kleren en handschoenen aantrekken in auto en wachtkamer

Trek uw kind voor de behandeling een warm pak aan met lange broek, een T-shirt en vest of trui met lange wijde mouwen. Een trainingspak is prima. Kinderen koelen snel af.

In de ochtend is het buiten, in de auto en in de praktijk nog koud en bij warm weer zet de tandarts de airconditioning aan. De twee lagen kleren, jas en handschoenen zijn nodig om uw kind warm te houden. Warme handen zijn belangrijk voor het inbrengen van het infuusbuisje. Houdt de handen van uw kind dus goed warm. Dan verloopt de behandeling gemakkelijker.

4. Het aanbrengen EMLA zalf

EMLA[®]-crème is een zalf die de huid verdooft. Door deze op de plaats te smeren waar de prik voor de anesthesie wordt gegeven, zal uw kind de naald nauwelijks voelen.



Breng de zalf **1 uur** van te voren aan. Ga als volgt te werk:

1. Knijp wat crème uit de tube op de door de anesthesist aangegeven plaatsen.
2. Dek de zalf af met behulp van de bijgeleverde, doorzichtige pleisters

U dient de zalf op linker en rechterhandrug aan te brengen.